

帯状疱疹ワクチン比較表

ワクチンの種類	生ワクチン(乾燥弱毒水痘生ワクチン)	不活化ワクチン(シングリックス)
接種方法・回数	皮下注射・1回	筋肉注射・2回 (2~6か月後)
接種対象年齢※1	制限なし(自費)	50歳以上(自費)
発症予防効果	51.3%	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8%
帯状疱疹後神経痛抑制効果	66.5%	50歳以上 100% 70歳以上 85.5%
持続期間	5年程度	9年以上
副反応	軽度の接種部位の痛み、腫れ、発赤 ※3日~7日で消失	接種部位の痛み、腫れ、発赤、倦怠感、頭痛 ※3日~7日で消失
接種費用(対象者の自己負担) ※2	6,000円(自費 組合員) 8,000円(自費 非組合員) 4,500円(公費)	19,500円/1回(自費 組合員) 22,000円/1回(自費 非組合員) 11,000円/1回(公費)
長所	・1回で済む ・費用が安い	・予防効果が高い ・妊婦や免疫が低下している方も接種できる ・持続期間が長い
短所	・妊婦や免疫が低下している方は接種できない ・持続期間が短い	・費用が高い ・副反応が比較的強い (接種部位の痛み 78%) ・2回接種が必要

※1 助成対象年齢 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳 100歳以上 (詳細は別紙参照) ※2 生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は確認書類提出後無料